


PREPARACION DEL COLON CON MOVIPREP

IMPORTANTE: Para una adecuada limpieza intestinal y evitar repeticiones, **SIGA RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.**

- En los 4 días previos no debe tomar ninguna medicación que contenga Hierro.
- Los dos días previos a la prueba seguirá una dieta pobre en residuos:


PUEDE TOMAR	NO PUEDE TOMAR
Pasta y huevos Caldos (no de verduras) Carnes y pescados a la plancha o hervidos Quesos duros Galletas sin fibra Pan tostado y mantequilla (poca cantidad) Zumos filtrados Café, té y líquidos sin gas	Ensaladas, verduras y legumbres Frutas Patatas, féculas Carnes y pescados en salsa o estofados Embutidos Leche o productos lácteos Grasa y pasteles Chocolate y bebidas con gas

CITA POR LA MAÑANA	CITA POR LA TARDE
<p>El día anterior a la prueba siga estas instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una vez se ha comido, esperar una hora antes de comenzar el tratamiento. <p>Prepare el primer litro de MOVIPREP y tómelolo a lo largo de una hora. Debería beber además ½ litro (aproximadamente dos vasos) de un líquido claro (agua, caldo, zumos de frutas sin pulpa, café/té...)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aproximadamente a las 9 de la noche preparar y tomar el segundo litro de MOVIPREP. Beber otro ½ litro de líquido claro. <p>No ingerir ningún alimento sólido ni líquido al menos 6 horas antes de la prueba</p>	<p>Siga estas instrucciones:</p> <p>El día anterior se puede realizar una merienda-cena ligera. Una hora más tarde preparar y tomar un litro de MOVIPREP a lo largo de una hora. Debería beber además ½ litro (aproximadamente dos vasos) de un líquido claro (agua, caldo, zumos de frutas sin pulpa, café/té sin leche...).</p> <p>La mañana de la prueba preparar y tomar el segundo litro de MOVIPREP. Beber otro ½ litro de líquido claro. No ingerir ningún alimento sólido ni líquido al menos 6 horas antes de la prueba</p>



- 1** Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B.
- 2** Añadir el contenido de ambos, sobre A y sobre B, en un recipiente de 1 litro.
- 3** Añadir 1 litro de agua en el recipiente.
- 4** Agitar hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia. Esto puede llevar hasta cinco minutos.

Cómo beberlo



Beba el primer litro de la solución a lo largo de una o dos horas. Intente beber un vaso completo cada 10 - 15 minutos.

Recuerde:

- Deberá venir acompañado.
- En ayunas de 6 horas.
- Suspender los medicamentos que se le indiquen.

Su cita es el día..... de

A las horas

En el Complejo Policlínico Hernán Cortés.

c/ Pizarro nº 8.

-Ante cualquier eventualidad, llámenos al 976 22 29 81

Durante el curso de este tratamiento, se recomienda que se beba un litro más de un líquido claro, con objeto de prevenir la sensación de encontrarse sediento y prevenir la deshidratación. Agua, caldo, zumos de frutas (sin pulpa), bebidas suaves, té o café (sin leche) son adecuados. Estas bebidas pueden tomarse en cualquier momento que se desee.